



Atención a pacientes agredidos por animales potencialmente transmisores de

RABIA



Lesión causada por mordedura/arañazo o lamedura de mucosas/piel lesionada ocasionada por:

1. Perro o gato observable, sin signos y síntomas de rabia.
2. Pequeños roedores (rata, ratón, hamster, ardilla, cuy, conejo).

Contacto con saliva o tejido nervioso con piel intacta.

NO EXPOSICIÓN

1. Atención inicial

- Lave la herida con agua y jabón.
- Evite suturar las heridas (si es necesario utilice puntos de afrontamiento).
- Considere el uso de toxoide tetánico y antibióticos.
- Diligencie la ficha de notificación y avise a epidemiología.

Lesión única en tronco, miembros superiores o inferiores, causada por mordedura/arañazo o lamedura de piel lesionada ocasionada por:

1. Perro o gato no observable o desconocido.

EXPOSICIÓN LEVE

1. Atención inicial

- Lave la herida con agua y jabón.
- Evite suturar las heridas (si es necesario utilice puntos de afrontamiento).
- Considere el uso de toxoide tetánico y antibióticos.
- Diligencie la ficha de notificación y avise a epidemiología.

2. Tratamiento específico

- Formule vacuna antirrábica según esquema (5 dosis) Días 0-3-7-14-30

Lesión múltiple en cualquier área del cuerpo o lesión única en cabeza, cuello, mano o dedos causada por mordedura/arañazo o lamedura de mucosas ocasionada por:

- Perro o gato no observable o desconocido.

Lesión causada por mordedura/arañazo o lamedura de piel lesionada y/o mucosas, sin importar el número o sitio anatómico ocasionada por:

- Perro o gato con signos o síntomas de rabia al momento de la agresión.
- Perro o gato con signos o síntomas de rabia durante los 10 días de observación.

EXPOSICIÓN GRAVE

1. Atención inicial

- Lave la herida con agua y jabón.
- Evite suturar las heridas (si es necesario utilice puntos de afrontamiento).
- Considere el uso de toxoide tetánico y antibióticos.
- Diligencie la ficha de notificación y avise a epidemiología.

2. Tratamiento específico

- Formule inmunoglobulina antirrábica, independiente del tiempo de ocurrida la agresión y tenga en cuenta:
 - Realice las pruebas sensibilidad: puntura e intradérmica.
 - En caso de ser positivas realice desensibilización.
 - Considere el uso de antihistamínicos antes de la aplicación.
 - Dosis: suero heterólogo (40UI/kg), suero homólogo (20UI/kg)
- Formule vacuna antirrábica según esquema (5 dosis) días 0-3-7-14-30

Riesgo laboral

1. Contacto de piel lesionada o mucosas con saliva o tejido nervioso de una persona o animal (perro, gato, vaca, cerdo, caballo, cabra) con rabia confirmada por laboratorio.
2. Contacto de mucosas con aerosoles en ambientes de laboratorio o cavernas de murciélagos con altas concentraciones del virus de la rabia.

Mayor Información

Consulte la guía práctica para la atención de personas agredidas por un animal potencialmente transmisor de rabia en temas de interés de www.ins.gov.co

Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública Equipo Funcional de Zoonosis

Av. Calle 26 No 51-20, Bogotá D. C. PBX 220 77 00 Ext. 1388